



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



- 12/01/2010

CYCLE DE KREBSDEVENIR DU PYRUVATEI/- Définition:

- Le cycle de Krebs (cycle de l'acide citrique) a été élucidé grâce aux travaux de Hans Krebs en 1937. Prix Nobel en médecine en 1953.
- C'est la voie du **catabolisme oxydatif aérobie** de l'acétyl coenzyme A en C
 - * **Oxydatif**: enlèvement d'atome d'H qui sont pris en charge par le NAD^+ et FAD
 - * **Aérobie**: En présence de O_2 .
- L'Acétyl CoA provient de:
 - * de la **décarboxylation oxydative** du pyruvate.
 - * de la **β oxydation** des acides gras.
 - * de la **dégradation** de certains **aminoacides**.
- Le cycle de Krebs est une voie commune au catabolisme des glucides, des lipides et des protéines.

II/- Rôle:

- Il présente un double intérêt:
 - * **Production d'énergie**: **90%** de l'énergie produites dans les cellules aérobie provient du cycle de Krebs en relation avec la chaîne de transport de électrons.
 - * Le cycle **fournit** également des **intermédiaires** pour les biosynthèses.
- Il participe à la fois au **catabolisme** et à l'anabolisme, il est dit **amphibolique**.

III/- Localisation:

- Elle a lieu dans toutes les cellules de l'organisme sauf les globules rouges (dépourvus de mitochondries).
- Elle est **mitochondriale**.

IV/- Vue d'ensemble du cycle de Krebs:

- C'est un ensemble coordonné de 8 réactions qui catabolisent l'acétyl
- Se déroule en aérobie dans la matrice mitochondriale.
 - * 7 enzymes solubles
 - * 1 enzyme fixée dans la membrane interne: la **succinate déshydrogénase**.
- 3 sites de régulation

I.- Etapes du cycle de Krebs:

1) Formation du citrate:

- Condensation entre l'acétyl CoA et l'oxaloacétate.
- **Irreversible**, site de régulation
- Catalysée par la **citrate synthase**.

2) Isomérisation du citrate en isocitrate:

- Isomérisation en deux temps par deshydratation / hydratation
- Réversible
- Catalysée par l'**aconitase** (isomérase)

3) Décarboxylation oxydative de l'isocitrate en α -cétylglutarate:

- Réduction du NAD^+ en NADH , H^+ et libération d'un CO_2 .
- **Irreversible**, site de régulation.
- Catalysée par l'**isocitrate deshydrogénase** à coenzyme NAD^+

4) Décarboxylation oxydative de l' α -cétylglutarate en succinyl-CoA:

- Réaction similaire à la PDH (Pyruvate deshydrogénase)
- Réduction du NAD^+ en NADH , H^+ et libération d'un CO_2 .
- **Irreversible**, site de régulation
- Catalysée par l' **α -cétylglutarate deshydrogénase**.

5) Formation du succinate:

- Réaction de clivage du thioester (liaison riche en énergie) couplée à la phosphorylation du GDP.
- Production de **GTP** et régénération du CoA.
- Régénération de l'ATP par le GTP sous l'action d'une **adénosine-diphosphokinase**: $\text{ADP} + \text{GTP} \rightleftharpoons \text{GDP} + \text{ATP}$
- Réversible
- Catalysée par la **succinyl CoA synthase**.

6) Deshydrogénation du succinate en fumarate:


- Réduction du FAD en FADH_2
- Réversible
- Catalysée par la **succinate deshydrogénase** liée à la membrane mitochondriale interne, appelée aussi complexe II de la chaîne respiratoire.


7) Hydratation du malate en fumarate

- Réversible
- Catalysée par la fumarase

8) Régénération de l'oxaloacétate:

- Réduction du NAD^+ en $NADH, H^+$
- Réversible
- Catalysée par la malate déshydrogénase







II/- Régulation :

- la régulation du cycle de Krebs permet d'adapter la fabrication de l'ATP et des intermédiaires précurseurs de synthèse selon les besoins de la cellule.
- des réactions catalysées par la citrate synthase, isocitrate deshydrogénase et α -ketoglutarate deshydrogénase sont des sites de contrôle.


1) Citrate synthase:



2) Isocitrate deshydrogénase:



3) α -Cétoglutarate deshydrogénase:



II/- Bilan énergétique:

Réaction

3. Isocitrate deshydrogénase
4. α -cétoglutarate deshydrogénase
5. Succinyl CoA synthase
6. Succinate deshydrogénase
8. Malate deshydrogénase

Bilan:

- + 1 NADH, H⁺
- + 1 NADH, H⁺
- + GTP
- + FADH₂
- + NADH, H⁺

TOTAL

1 ATP, 3 NADH, H⁺ + 1 FADH₂